

Hoe te bewaren?

Een oplossing is maximaal 24 uur houdbaar, indien bewaard in de koelkast. Na bewaring in de koelkast kan het nodig zijn om extra water toe te voegen om de geschikte consistentie te bereiken.

Opgelost product kan (binnen 24 uur na oplossing) in de diepvries bewaard worden. Na bewaring in de koelkast of de diepvries de oplossing opwarmen tot 20 - 40 °C.

Een aangebroken verpakking is, indien goed afgesloten, 6 maanden houdbaar. Deze dient niet in de koelkast bewaard te worden.

Wat als uw dier Critical Care® weigert?

Dieren zijn soms zo gewend aan hun dagelijkse smaken dat zij Critical Care® in het begin weigeren. U dient dan het volgende te doen.

Maak altijd verse brij. Gebruik steeds warm water om het natuurlijk grasaroma van Critical Care® vrij te laten komen. Begin met kleine hoeveelheden, zodat het dier aan de smaak gewend raakt. Probeer na enkele uren opnieuw. Gebruik zeker een spuit zoals door de dierenarts geadviseerd. U kunt ook wat van het normale voer, dat uw dier graag lust, onder Critical Care® mengen bijvoorbeeld banaan, geraspte appel, wortelbrij en dergelijke.

Wanneer stoppen met Critical Care®?

Met Critical Care® kan gestopt worden als het dier de normale voeding goed opneemt en als het dier zijn normaal gewicht en conditie terug heeft bereikt.

De overgang van Critical Care® brij of balletjes naar de normale voeding is eenvoudig als men de normale voeding bestrooit met Critical Care® poeder. De hoeveelheid Critical Care® laat men dalen gespreid over enkele dagen.

Samenstelling:

Timothee gras en andere vezels, gestabiliseerd vitamine C, Lactobacillus sporogenes, tarwe-kiemmeel, xanthangom, anijs en vele andere vitaminen en micro-elementen in wateroplosbare vorm.



Dierspecifiek advies

Cavia

Cavia's hebben een grote behoefte aan vezels en vitamine C. Deze twee producten zijn ruim voldoende aanwezig in Critical Care®. Na een kuur met Critical Care® neemt het gewicht van de cavia toe, normaliseert de ontlasting en heeft het dier minder last van winderigheid. Na enkele weken verbetert ook de huid en het haarkleed. Baby cavia's nemen al na enkele dagen vaste voeding op. Daarom kan Critical Care® bij verweesde jonge cavia's als opfokvoer gebruikt worden. Zie doseertabel voor dosering verdeeld over verschillende maaltijden.

Chinchilla

Ook chinchilla's zijn planteneters en hebben voordeel bij Critical Care® voeding. De herstelperiode van een ziekte kan met dit speciale voer duidelijk verkort worden. Zie doseertabel voor dosering verdeeld over verschillende maaltijden.

Konijn

Een als troeteldier gehouden konijn kan natuurlijk ook met Critical Care® gevoerd worden. Konijnen zijn stressgevoelig, dus dient voeding, en zeker voeding met een spuit, kalm en behoedzaam toegediend te worden. Het ideale voedingsschema voor Critical Care® is voeren om de 3 tot 4 uur. Als het voeren een te grote stressfactor is, dan slechts 3 voedingen per dag geven. Zie doseertabel voor dosering verdeeld over verschillende maaltijden.

Reptielen en vogels

Plantenetende reptielen, vogels en zoogdieren in dierentuinen e.d. kunnen tijdelijk met Critical Care® gevoerd worden. De doseertabel is niet voor al deze dieren van toepassing. Soms dient men wat meer te geven (bijvoorbeeld bij vogels) en soms wat minder (bijvoorbeeld bij reptielen).

Plantenetende schildpadden hebben tweemaal daags 2 tot 3 ml opgeloste Critical Care® per kg lichaamsgewicht nodig. Afhankelijk van hun activiteitsgraad en gewichtsontwikkeling zal dit geleidelijk (7 tot 10 dagen) tot tweemaal daags 10 ml per kg lichaamsgewicht verhoogd worden.

Voor meer informatie raadpleeg uw dierenarts.



Distributeur Nederland: Eurovet Animal Health
Handelsweg 25, 5531 AE Bladel
Eurovet NV
Poorthoevestraat 4
B-3550 Heusden-Zolder

VPK nr. 1176265

Critical Care®



Critical Care®

Voedersupplement voor slecht etende kleine herbivoren zoals konijnen, cavia's, chinchilla's, schildpadden e.d.

- **Uitgebalanceerd:**
Het percentage vezels bedraagt 23%.
- **Lekker:**
Critical Care® sluit het dichtst aan bij het natuurlijke dieet van kleine herbivoren, zowel in smaak als in samenstelling.
- **Gebruiksvriendelijk:**
Eenvoudig te mengen en toe te dienen.
- **Levensreddend:**
Soms kunnen dieren geen of moeilijk voedsel opnemen, zoals bij tandproblemen, oudere dieren, spenen en chirurgie.
- **Voorkomt stress:**
Critical Care® wordt goed geaccepteerd door de dieren.
- **Betrouwbaar:**
Wereldwijd gebruikt door vakspecialisten.

Aan de hand van onderstaande doseertabel kan de dosering per kg lichaamsgewicht bepaald worden. Volg het advies van uw dierenarts.

Doseertabel						
Lichaams- gewicht	Aantal ml per dag	Aantal maaltijden per dag en de hoeveelheden per maaltijd				
		3-maal	4-maal	5-maal	6-maal	7-maal
0,5 kg	25 ml	8 ml	6 ml	5 ml	4 ml	3 ml
1,0 kg	50 ml	17 ml	13 ml	10 ml	8 ml	7 ml
1,5 kg	75 ml	25 ml	19 ml	15 ml	13 ml	11 ml
2,0 kg	100 ml	33 ml	25 ml	20 ml	17 ml	14 ml
2,5 kg	125 ml	42 ml	31 ml	25 ml	21 ml	18 ml
3,0 kg	150 ml	50 ml	38 ml	30 ml	25 ml	21 ml
3,5 kg	175 ml	58 ml	44 ml	35 ml	29 ml	25 ml
4,0 kg	200 ml	67 ml	50 ml	40 ml	33 ml	29 ml

Dagelijks dient een verse oplossing gemaakt en gebruikt te worden.

Hoe te mengen?

Het zakje Critical Care® voor openen goed schudden.
1 deel Critical Care® oplossen met 1,5 deel lauw water en goed mengen.

Hoe toe te dienen?

Er zijn 2 mogelijkheden:

1. De oplossing voeren als brij uit een schaalkje.
2. De oplossing voeren met behulp van een injectiespuit van 10 ml (zonder naald). Op de pagina hiernaast worden de stappen beschreven voor toediening met behulp van een injectiespuit.

Steeds voldoende drinkwater ter beschikking stellen aan het huisdier. Volg het advies van uw dierenarts op.

Critical Care® blijven gebruiken totdat het dier de normale voeding goed opneemt en het zijn normale conditie en gewicht weer terug heeft.

Alternatieve toediening:

Aan dieren die aan het herstellen zijn kunnen balletjes Critical Care® toegediend worden. Door Critical Care® poeder te mengen met weinig water kunnen balletjes gerold worden.

Bij uitzondering kan Critical Care® poeder ook over het normale voer gestrooid worden om de eetlust te stimuleren. Zorg steeds voor voldoende drinkwater.

Stappen voor toediening van Critical Care® met behulp van een injectiespuit (zonder naald).

Het zakje Critical Care® voor openen goed schudden.



1 deel Critical Care® oplossen met 1,5 deel lauw water.

Critical Care® en het water goed mengen.

De stamper van een injectiespuit van 10 ml (zonder naald) verwijderen en met behulp van een klein lepeltje de spuit vullen met de brij.

De stamper terug in de spuit steken en de brij met behulp van de injectiespuit (zonder naald) zachtjes in de mond van het dier spuiten.

Steeds voldoende drinkwater ter beschikking stellen aan het huisdier. Volg het advies van uw dierenarts op.